

数値で判定する主な検査と正常値

	検査項目	正常値
前立腺の検査	A C P (酸性フォスファターゼ)	0~0.8 B L 単位 (ベッシー・ローリー法) 1~4 K A 単位 (キンド・キング法)
	P A P (前立腺酸性フォスファターゼ)	0~0.2 B L 単位 (ベッシー・ローリー法) 0~0.6 K A 単位 (キンド・キング法) 3.0ng / ml 以下 (R I A 法)
ガンの検査	<腫瘍マーカー>	
	C E A (ガン胎児性抗原)	2.5ng / ml 以下 (サンドウィッチ法) 5.0ng / ml 以下 (Z-ゲル法)
	A F P (α-フェトプロテイン)	20ng / ml 以下 (R I A 法)
	C A 19-9 (糖鎖抗原19-9)	37U / ml 以下 (R I A 法)
	フェチリン	<男>16~194ng/ml <女>10~80ng/ml (R I A 法)
	P A P (前立腺酸性フォスファターゼ)	3.0ng / ml 以下 (R I A 法)
	T P A	110U / l 以下 (R I A 法)
アレルギー反応検査	皮膚反応	陰性 (-)
	血液像	好酸球5%以下
	I g E (免疫グロブリンE)	陰性 (0.0005mg / dl 以下)
食 便 検査	血液、髄液、尿、喀たん、胆汁、便、胃液など	陰性 (-)
目・耳の検査	眼 圧	21mmHg 以下
	視 圧	[裸眼視力] 0.8~1.2
	聴 力	-10~+20 d B

(注) * 正常値は、成人の場合を示しました。なお、医療機関により検査法が異なるので、正常値や単位が違う場合があります。また、英文略語も医療機関により多少違います。